



Gobierno del
Estado de Sonora


Secretaría de
Salud Pública

Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades

Covid19. Situación epidemiológica por jurisdicción sanitaria Sonora, 2020

Julio 24, 2020

COVID-19. Situación epidemiológica, Sonora





- Las JS de Hermosillo, Caborca y Santa Ana superan la incidencia media (530 por 100 mil) del estado
- La JS de Ciudad Obregón tiene la tasa de mortalidad y de letalidad más elevadas del estado
- **Distribución heterogénea**, con áreas de alto riesgo en 25 localidades; la mayoría ubicadas en las JS de Ciudad Obregón y Navojoa

Situación epidemiológica COVID-19

- 01/May/2020 16 municipios tenían casos
- 01/Jun/2020 36 municipios tenían casos
- 22/Jul/2020 63 municipios con registro de casos
- **NO HUBO MUNICIPIOS NUEVOS CON CASOS**

44 municipios se mantienen con transmisión activa del virus, incluidos los 10 de mayor tamaño Poblacional

Todos los municipios de las JS IV, V y VI se encuentran activos




Casos y defunciones de COVID-19 por municipios prioritarios. Sonora, 2020

Municipio	Casos no fatales	Defunciones	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad**	Variación porcentual en última semana
Empalme	92	22	36.2	19.3	+19%
Cajeme	2062	417	89.3	16.8	+7%
Guaymas	529	108	62.8	17.0	+11%
SLRC	967	158	76.0	14.0	+4%
Navojoa	600	80	44.6	11.8	+13%
Huatabampo	158	21	20.5	11.7	+19%
Puerto Peñasco	54	5	7.0	8.5	+23%
Nogales	1668	187	72.1	10.1	+6%
Agua Prieta	430	33	35.5	7.1	+10%
Hermosillo	6306	362	39.5	5.4	+25%
Caborca	576	34	35.3	5.6	+9%


* Tasa de mortalidad por 100 mil habitantes. **Tasa de letalidad por 100 enfermos detectados

Situación epidemiológica COVID-19




Situación epidemiológica COVID-19

Casos nuevos últimos 7 días en los 8 municipios con mayor población




Situación epidemiológica COVID-19

Decesos por semana (última semana en proceso)









Comportamiento de la positividad a SARS-CoV-2 en muestras de hisopado faringeo y nasofaringeo para qPCR. Sonora, 2020



Positividad (%) semana 29, 2020.

SARS-CoV-2


		Muestras
• JS1: 58.4		341
• JS2: 50.0		88
• JS3: 69.2		46
• JS4: 54.9		163
• JS5: 61.9		15
• JS6: 64.9		47

COVID-19. Situación epidemiológica, Sonora

FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades/Servicios de Salud de Sonora

COVID-19. Situación epidemiológica, Sonora

Muestras para SARS-CoV-2 por qPCR, según municipio y jurisdicción sanitaria
(19 al 23 de julio, 2020)



Conclusiones



- Sin evidencia aún, de disminución consistente y homogénea en Sonora, ni de la incidencia, la ocupación hospitalaria ni la tasa de positividad
- Aunque todos somos susceptibles al virus SARS-CoV-2, no todos somos igualmente vulnerables a sus efectos
- No únicamente hay vulnerabilidad biológica (p.e. DM2, HTA, obesidad), COVID-19 afecta comunidades con mayor rezago social en Sonora
- 25 localidades, 18 de ellas rurales, tienen una letalidad global de 18.1%. Diez de esas localidades se encuentran en la jurisdicción de Navojoa; otras 7 están en la JS de Ciudad Obregón
- Deben fortalecerse las acciones de búsqueda intencionada, atención oportuna y seguimiento de casos y contactos, usando el enfoque de riesgo
- NO hay motivo para disminuir las acciones pues el riesgo de repuntes sigue latente

Comentarios