



# Situación epidemiológica de COVID-19 en Sonora

Julio, 30 de 2020




# COVID-19 en el mundo

México es **9° lugar mundial** en carga relativa de morbilidad y **7°** de mortalidad por COVID-19



Total de pruebas de qPCR para SARS-CoV-2 por millón de habitantes. Diez primeros países en el mundo.  
(Julio 28, 2020)



FUENTE: Elaboración propia con datos de <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>. Consulta (Julio 28, 2020)

## Pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 en el mundo

La acción es simple

¿Conseguiste el resultado?


Si

No

Sigue así


Cambia algo

COVID-19. Casos confirmados, defunciones y pruebas de PCR realizadas por 1 millón de habitantes, en estados seleccionados del norte de México  
(Al 28 de Julio, 2020)




## Tres indicadores epidemiológicos de COVID-19

COVID-19. Mortalidad por 1 millón de habitantes. Diez primeros estados en México.  
(Al 27 de julio, 2020)



Mortalidad por COVID-19. Diez primeros estados del país


COVID-19. Letalidad por 100 hab. México, 2020  
(Al 28 de julio)



## Letalidad por COVID-19, México

- Sonora se ubica en la posición 19 a nivel nacional
- Diferencias regionales al interior de la entidad


Tasa de letalidad (%) por COVID-19, según Jurisdicción Sanitaria de residencia. Sonora, 2020  
(Al 27 de julio)




FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades/SSS

Letalidad por COVID-19. Sonora, 2020

# Letalidad por COVID-19. Sonora, 2020




## Áreas prioritarias [Defunciones (Letalidad %)]






# Letalidad por COVID-19. Sonora, 2020

Tasa de letalidad (%) por COVID-19, según institución de salud. Sonora, 2020  
(Al 27 de julio)




FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades/SSS

# Letalidad por COVID-19. Sonora, 2020



FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades/SSS

# Letalidad por COVID-19. Sonora, 2020




# Comentarios

- No es aleatoria la elevada carga de morbilidad y mortalidad por COVID-19 en el noroeste del país
- COVID-19 impacta mayormente a grupos vulnerables
- La vulnerabilidad es una mezcla de determinantes biológicos, ambientales y sociales, tanto de nivel personal como comunitario
- Determinantes biológicos: en Sonora, 75% de las muertes ocurrieron en adultos con comorbilidades
  - Prevalencia estimada de DM2: 12% (10-15%)
  - Prevalencia estimada de HTA: 32% (30-35%)
  - Prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad adulta: 75.2%



# Comentarios



- Las personas mayores de 60 años tienen 7.7 veces mayor carga de mortalidad que el resto de la población, mientras los de 50 a 59 años tienen 2.9 veces más veces
- Los hombres adultos, especialmente los mayores de 60 años, y las mujeres mayores de 60 años con comorbilidades, son grupos de alto riesgo
- Sin detección temprana, basada en tamizaje sintomático y pruebas de qPCR, será difícil anticiparse al riesgo de transmisión
- ANTICIPA debe llevarse a localidades prioritarias con alta letalidad, como las que se proponen en esta presentación